



Ieder extra lam telt

Superbiest (René van den Brom, GD)

- Het belang van goede voeding begint al voor de dracht.
- Suboptimale voeding zorgt voor minder ovulaties (eisprongen), meer embryonale sterfte, matige ontwikkeling van de placenta, verminderde groei van de foet, vroeggeboorte van lichtere lammeren met weinig reserves en een ooi die te weinig biest en melk produceert.
- Een lam wordt geboren zonder weerstand en zal door middel van biest weerstand voor de eerste levensweken moeten verkrijgen.
- Biest: Veel, Vlug, Vaak en Vers (VVVV).
- Vaccinatie zorgt voor extra bescherming (met name tegen het bloed).

Handige greepjes (Mark van der Heijden, ULP)

- Wees extra alert op het eerste en laatste schaap dat aflammet.
- Blijf altijd rustig! Werk schoon en gebruik veel glijmiddel!
- Zorg dat je weet wat de ligging van een lam is.
- Is de ooi daadwerkelijk leeg?
- Geen vordering: bel op tijd uw dierenarts.

De Kraamkamer (Karianne Lievaart-Peterson, GD)

- Afzondering: rust, privacy, risicobeperking, voorkomen verstoring van het geboorteproces, tegengaan stelen van lammeren en goed voor de ooi-lam-binding.
- Hygiëne: kraamhok, materialen, mensen, kleding/schoeisel, navel, oormerk tang.
- De ooi: uier (uierontsteking, speenbijten), nageboorte (compleet, afkomen), lijfbieden, gedrag (acceptatie lammeren), etc.
- De lammeren: navel (niet te kort, desinfectie), drinken (evt. Biestopname Check), ontlasting (afkomen darmpek, diarree), onderkoeling.

Houd de groei erin (Piet Vellema, GD)

Breng focus aan; bij een aflamperiode in februari-maart:

- 15 mei spenen: lukt alleen bij goede groei!
- <12% lammersterfte tot spenen: lukt dat? Niet zomaar..
- Fokoolammeren direct afleveren: groei moet goed zijn geweest!
- 15 juli: helft slachtdieren afgeleverd: moet lukken bij goede groei!

Uitgangspositie moet goed zijn: hygiëne rondom geboorte, goed geboortegewicht, controle ooi en lammeren, voldoende biest, goed krachtvoer en ruwvoer, tijdig en goed spenen, weiden op schoon land.